



Aconsejo **vacunas individualizadas**

## Plan vacunal para perros adultos en La Rioja (España)

El protocolo de vacunación en perros adultos lo adapto tanto a la situación epidemiológica y normativa regional como a las recomendaciones científicas internacionales (WSAVA 2024 pinchar en ese enlace: <https://wsava.org/wp-content/uploads/2024/05/ESP.-J-of-Small-Animal-Practice-2024-Squires-2024-guidelines-for-the-vaccination-of-dogs-and-cats-compiled-by-the.pdf>)

En **La Rioja**, la vacunación antirrábica es **obligatoria cada dos años**, mientras que otras vacunas se aplican en función del riesgo sanitario y estilo de vida del animal.

**Vacunas esenciales (“core”)** Son las vacunas que **todo perro adulto** debe recibir, independientemente de su modo de vida:

**Rabia** (vacuna Inactivada) **Obligatoria cada 2 años** en La Rioja. Vacunar a partir de los 3 meses de edad. Ver información completa en el Decreto 26/2014. <https://web.larioja.org/normativa?n=1975>

**Leptospirosis** Vacuna Inactivada (L4) (serovares *L. icterohaemorrhagiae*, *L. canicola*, *L. grippityphosa*, *L. australis*) Vacunación **Anual** Considerada core en regiones húmedas o rurales como La Rioja. *La Leptospirosis se considera “esencial” en La Rioja por la presencia de reservorios silvestres y ambientes húmedos, sobre todo en zonas de regadío y ganaderas.*

**Moquillo canino (CDV)** Virus vivo modificado (MLV) Cada **3 años** tras la serie inicial de cachorros. Puede sustituirse por control serológico.

**Adenovirus canino tipo 1 (CAV-1)** MLV o recombinante Cada **3 años** Protege frente a hepatitis infecciosa

**Parvovirus canino tipo 2 (CPV-2)** MLV o recombinante Cada **3 años** Inmunidad duradera.

### Control serológico

Para perros adultos correctamente vacunados, puede emplearse la **serología (títulos de anticuerpos)** frente a **moquillo, parvovirus y adenovirus** como alternativa a la vacunación. Un perro adulto riojano correctamente inmunizado debería recibir **vacuna trivalente cada tres años, leptospirosis cada año y rabia cada dos años** por obligación legal.

Las vacunas complementarias (tos de las perreras, leishmaniosis) se valorarán según su entorno, estilo de vida y exposición a vectores.